














Variety chart

Tableau des variétés



Z.I. de Lanrinou
29206 Landerneau cedex - France
e-mail : michel.cam@triskalia.fr

	Spunta (reference)	Fridor	Nicola	Fribel	Oceania	Europa	Mandola 	Charlene 	Rubis	El Beïda	Speeda
Inscription (registration)		2009		2010			2010	2010		2011	2012
Peau (skin)											
Chair (Flesh)											
Forme (shape)											
Régularité (regularity)	7	8	7	6	7	8	8	8	7	9	7
Yeux (eyes)	8	7	7	6	6	8	7	8	8	7	7
Maturité/Précocité (maturity)	7	4	5	5	7	8	6	7	7	7	7
Repos végétatif (dormancy)	5	6	4	3	6		3	5		8	
Conservation (Keeping)	4	8	6	8	9	6	3	8	5	8	8
Proportion gros tubercules		9		7			5	3	7		7
Indice de rendement (Yield)	111	111	96	100	100	115	104	93	92	110	110
Grosueur (Grading)	9	9	4	7	7	7	5	3	7	7	7
Groupe culinaire (cooking type)	B	B-C	A	B-C	B-C	A-B	B	A	B	A-B	B
Matière sèche %	2	6	5	5	8	1	6	3	3	4	4
Coloration à la friture (coloring with frying)	4	7	4	7	8	5	3	5	4		
Qualité gustative (gustative qualities)		8		7			9	8		8	8
Tenue à la cuisson (firmness to cooking)		5		5			5	9		9	8
Noircissement à la cuisson (blackening after cooking)		7		8			7	9		9	9
Nématode Ro 1-4	3	R	R	3	R	R	3	R	3	3	R
Mildou du feuillage (leaf blight)	5	5	4	3	7	3	3	3	4	3	3
Mildiou du tubercule (Tuber blight)	5	1	6	2	7	8	1	5	5	5	3
Gale commune (common scab)	4	5	7	7	7	3	7	3	5	8	6
Gale verruqueuse	9	9	9			9	R	R	3		
Virus X	S	3	R	3		S	3	3	S		
Virus A	R	R	3	9		S	R	3	S		
Virus Y	7	3	6	3	5	1	7	5	4	7	5
Enroulement (Leaf roll virus)	3	3	5	7	5	2	1	5	5	7	7
Egermage (Desprouting)	4	3	6	5	7	6	5	3	5	7	3
Tache de rouille (rust spot)	6	6	7	4		7	7	7	4	9	8
Cœur creux (hollow heart)		6		7			5	7		9	8
Tâche cendrée		5		5			7	5			
Sensibilité aux chocs (bruising)		7		7			3	5			

Légende
1 : faible, 9 : excellent